

Sei un soggetto a rischio di aver contratto un'infezione da HBV e HCV?

Categorie di soggetti a rischio di aver contratto un'infezione da HBV e HCV e/o che devono essere sottoposti a ricerca dei marcatori virali

Nome _____

Cognome _____

<input type="checkbox"/>		Utilizzatore di sostanze stupefacenti endovena (attivo o che lo sia stato in passato)	<input type="checkbox"/>		Consumatore di droghe per via inalatoria
<input type="checkbox"/>		Emodializzato	<input type="checkbox"/>		Sottoposto a procedure invasive mediche , odontoiatriche o estetiche (tatuaggi) in ambienti a basso standard di sterilizzazione dello strumentario
<input type="checkbox"/>		Personale sanitario	<input type="checkbox"/>		Persona emotrasfusa o sottoposta a trapianto d'organo prima degli anni '90
<input type="checkbox"/>		Emofilici che abbiano ricevuto emoderivati prima degli anni '90	<input type="checkbox"/>		Familiari e partner sessuali di soggetti con infezione da HBV/HCV
<input type="checkbox"/>		Bambini nati da madri con infezione da HBV o HCV	<input type="checkbox"/>		Soggetti che abbiano effettuato iniezioni con siringhe di vetro non monouso
<input type="checkbox"/>		Detenuti	<input type="checkbox"/>		Soggetti con infezione da HIV
<input type="checkbox"/>		Soggetti con attività sessuale promiscua , in particolar modo uomini, o con precedenti malattie o alla diagnosi di malattie sessualmente trasmesse	<input type="checkbox"/>		Immigrati provenienti da aree ad alta endemia di infezione da HBV (Europa Orientale, Estremo Oriente, Africa sub-sahariana) e da HCV (Egitto, Pakistan, Afghanistan, Medio Oriente)

Accanto a queste categorie, la ricerca dei virus dell'epatite B e C deve essere effettuata nei soggetti con:

- **Transaminasi alterate** in almeno 2 occasioni
- **Malattia epatica da altra causa** (alcol, sindrome metabolica, malattie autoimmuni)
- **Donne in gravidanza** o che programmano una gravidanza o devono andare incontro a fecondazione assistita
- Prima di intraprendere **trattamenti con farmaci immunosoppressivi** (ivi compreso steroidi a dosi superiori all'equivalente di 7,5 mg/die di prednisolone per più di 2 settimane)